

Nome do Paciente: \_\_\_\_\_

Data de Nascimento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_      Leito: \_\_\_\_\_

Horário de Início: \_\_\_\_:\_\_\_\_      Horário de Término: \_\_\_\_:\_\_\_\_

Médico Responsável: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

COLE A ETIQUETA AQUI

CRITÉRIOS DE SEGURANÇA

- ☐ Estável hemodinamicamente
- ☐ SpO<sub>2</sub> ≥ 90% com suporte estável
- ☐ Sem uso de bloqueador neuromuscular
- ☐ Sem hipertensão intracraniana suspeita
- ☐ Sem agitação grave nas últimas horas

PREPARO DO PACIENTE

- ☐ Cabeceira 30-45°
- ☐ Aspiração de vias aéreas (se necessário)
- ☐ Dispositivos fixados (TOT, cateteres, drenos)
- ☐ Monitorização contínua ativa
- ☐ Sem agitação grave nas últimas horas
- ☐ Contenção mecânica avaliada/aplica
- ☐ Equipe informada

| TEMPO    | FC | PA | FR | SPO | RASS | BPS |
|----------|----|----|----|-----|------|-----|
| 0 min    |    |    |    |     |      |     |
| 15 mins  |    |    |    |     |      |     |
| 30 mins  |    |    |    |     |      |     |
| 60 mins  |    |    |    |     |      |     |
| 90 mins  |    |    |    |     |      |     |
| 120 mins |    |    |    |     |      |     |
| 180 mins |    |    |    |     |      |     |
| 210 mins |    |    |    |     |      |     |
| 240 mins |    |    |    |     |      |     |

CRITÉRIOS DE INTERRUPÇÃO

- ☐ RASS ≥ +2
- ☐ SpO<sub>2</sub> ≤ 90%
- ☐ FR > 35 irpm
- ☐ FC > 140 ou < 40 bpm
- ☐ Instabilidade hemodinâmica
- ☐ Arritmias
- ☐ Risco de autoextubação

CONDUTA FINAL

- ☐ Mantido em despertar

☐ Reiniciada sedação (dose: \_\_\_\_\_ / Horário: \_\_\_\_:\_\_\_\_)
- ☐ Ajuste de analgesia

☐ Iniciado teste de respiração espontânea
- ☐ Avaliação médica solicitado

Carimbo/Assinatura Enfermeiro

Carimbo/Assinatura Médico